AUERTISSEMENTS

PUBLICATION PERIODIQUE CPP Nº 536 A D

AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION "ILE DE FRANCE"

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE SAINT-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

47, rue Paul Doumer, 93100 MONTREUIL - Tél. 287.76.71

ABONNEMENT ANNUEL : 92 F

Régisseur de Recettes - D.D.A-P.V-Services Vétérinaires 107 bis, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010 PARIS C C P 9063 96 U PARIS

BULLETIN Nº 254 27 Juin 1984

EDITION GRANDES CULTURES

MAIS

Après un départ difficile le maîs est bien reparti.

Les pucerons sont peu nombreux. Les premiers ailés de Sitobion avenae et parfois de Metopolophuim dirhodum arrivent tout juste: on en trouve 1 ou 2 par pied seulement entourés de quelques aptères. Cela ne justifie évidemment aucun traitement.

Les grosses sorties de pyrale adultes devraient avoir lieu vers la fin Juillet avec quelques jours de retard par rapport à l'année dernière : les traitements devraient s'envisager donc pour la dernière décade de Juillet même pour les zones les plus précoces.

BLE

Pucerons sur épis : les seuils de traitement de 1 épi sur 2 infesté (ou environ 10 pucerons par épi) sont parfois atteints et dépassés : le traitement se justifie alors tout à fait. Pour la liste des produits se reporter au bulletin n° 251 du 12 Juin 1984. Glumes noires sur la variété FIDEL : on en observe les premiers symptomes : il ne s'agit pas de septoriose mais d'un phénomène variétal sans conséquence sur le rendement.

*TOURNESOL

Des grillures , dues à des carences induites d'un oligo-élément, s'observent de façon plus ou moins marquée selon les parcelles : les feuilles présentent des plages jaunâtres (en tâches d'huile), puis brunes et nécrosées. L'ESPACE FOLIAIRE AUTOUR DES NERVURES RESTE VERT. Rien n'est à prévoir puisque le phénomène est dû à une interaction entre les facteurs climatiques et sol.De toute façon, ceci devrait s'estomper.

*Les pucerons sont apparus, timidement dans certaines parcelles (5 à 10 par feuilles en moyenne ou niveau d'infestation plus élevé localement (une centaine par feuille ou bouton floral).

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

La situation est variable suivant les secteurs :

- dans ceux ayant subi des pluies d'orage relativement importantes en fin de semaine dernière, la protection n'est plus assurée et un nouveau cycle a pu démarrer à cette occasion ; une protection s'impose impérativement dès reception de ce bulletin.

- dans les autres, la situation reste stationnaire depuis le dernier bulletin, toutefois compte tenu de l'accroissement de la végétation le dernier traitement arrive en fin d'efficacité. Toute pluie qui entrainera une quinzaine d'heurs d'humidité devra être suivie d'un traitement dans les 48 heures.

CONCOURS MILDIOU: le concours reste ouvert. Dans les zones ayant subi des orages, une sortie de tâches est à prévoir dans les prochains jours.